

松

峰

說

疫

松峯說疫卷之四

蒲城劉奎松峯著輯

男秉錦濯西述較

福山劉嗣宗南瑛參閱

孫李逢虔謹葺錄

辨疑

辨溫病陰暑

此事難知云冬行秋令當寒而溫火盛水虧云云推作瘟病之原固爲近理乃又云火土合德濕熱相助故爲溫病是溫病必原於濕熱將濕熱一門並可以不立矣須知濕熱乃夏時之正氣瘟疫乃天地之雜氣二者迥乎不同謂

瘟病而兼濕熱則有之未聞濕熱而爲瘟病者也又云惟
房室勞傷辛苦之人得之是省房室就安逸之人必無瘟
病矣有是理乎每見瘟疫盛行之年節欲安逸之輩往往
有無端而感者又何以稱焉又云冬欲辛苦之人腎水內
竭陽氣外泄生化之源旣絕身之所存獨熱云云謂瘟病
中有此一種則可耳若云瘟病盡由乎此則萬無是理也
至于暑字字彙解爲夏天氣熱則人之受是氣者斷無尚
有屬陰之理其曰陰暑者祇因人畏暑納涼外受寒邪所
致仍是感冒乃拋却現在之受寒而止泥前此之受暑故

以陰暑名之亦猶之曰陰熱也有是理乎知陰熱二字之不通則知暑之不可以陰言也明矣

辨夏涼冬煖不足致疾

吳又可瘟疫論中駁冬溫之說曰夏涼冬煖轉得春秋之和氣豈有因其和而反致疾者

四時之序應寒則寒應煖則煖所以人得天地之正氣不能爲病若夏宜熱而反涼冬宜寒而反煖未有不致疾者但夏過於涼其爲病也卽時而見惟冬令天氣過于和煦往往當時不能爲害至來歲春夏之間方大發瘟疫此余

屢經而屢驗者實非臆說也第夏應熱而反涼人感寒邪而閉塞腠理不能踈泄其爲病也固無足異唯冬時有非節之煖當時不卽病必至來歲春夏間始作此誠不可解也人動曰冬傷于寒至春夏變爲溫暑病余則曰冬過于溫至春夏多發瘟疫病彼吳又可謂冬煖夏涼不足以致疾也吾幸不以爲然蓋以煖屬于春涼屬于秋煖與涼爲春秋之正氣謂之和也始宜若見于冬夏之令

夏涼此爲冬煖

非其時有其氣則不得謂之和矣不和卽爲反常之戾氣此夏涼冬煖之多致疾也又烏得言溫煖清涼之未必爲

病也哉

辨吳又可偏用大黃

瘟疫一症感邪厲之毒十之六感溫熱之毒十之四故用黃連解毒等湯不唯在表時服之寒凝血滯厥疾不瘳卽邪熱內傳應服涼藥余往往不用黃連不過生地丹皮二冬元參銀花童便極數用石羔梔子黃芩而止無不奏效故吳又可戒用寒劑而專用大黃亦未可爲非蓋大黃雖寒其性走而不守當瘟疫膠固之時得此一番推盪邪便解散較純用寒涼者固勝一籌但邪未入腑而輒用之旣

不能解在經之邪徒受寒中破腹之患其害有不可勝言者又可之用大黃雖不孟浪至是但宜下諸症未免偏于攻墜全忘下不厭遲之說

師又可而舉手即用大黃反引又可爲證則又爲又可之罪人矣

辨用老君神明散東坡聖散子

活人云一歲之中病無長幼率相似此則時行之氣俗謂之天行是也老君神明散務成子螢火丸聖散子敗毒散不拘日數淺深吐下隨症施行所

以聖散子不問陰陽表裡也

語云用古方治今病譬如拆舊料葺新房不再經匠氏之手豈可用乎。旨哉斯言。洵堪爲醫學用藥之準矣。夫古今之元氣不同。觀漢人之處方。動以兩計。宋元而降。不過錢計而已。以漢人之方治今人之病。吾知其過于峻重。以今人之方治漢人之病。吾其不及病情。此處方分兩之未可泥也。至于用藥之權衡。則又不得以漫投者。葺四方之風土不齊。羣倫之老少各異。天道之寒暄無定。南北之燥濕頗殊。人在氣交之中。或偏于陽。或偏于陰。或有時而壯旺。

或有時而虛怯卽一人之身。一日之際內傷七情外感六氣其病情之出沒隱現真有若雲龍之不可方物者若必執一方以應無窮之變也有是理乎活人以老君神明散東坡聖散子爲治疫癘之的方不拘日數之淺深病症之吐下亦不問陰陽表裡便率爾妄投其不殺人如豚者鮮矣蓋二方中用烏附吳萸毒熱之品陰寒直申者服之庶或無過若傷寒傳經熱症以及瘟疫瘟疫正宜用芩連大黃之時若投此湯入口必斃神明散用絹袋盛帶以此外治不服食尚不能爲害至千聖散子則煎服之藥是斷斷

乎不可用者此方藥味亂雜卽真陰寒症用之亦恐未能
獲効也後世因過信蘇長公隨奉爲良劑甘就死地噫抑
何其爲東坡之名之所以以至於此哉以及神明散不過
平人所製假以李蘇之名以眩人之耳目好異者遂深信
而不疑若必出是方出旨李蘇則張景岳新方八陣中王
母桃一品豈真瑤池仙用之所垂乎吾願世之業醫者不
可拘于一定之方亦不可執其一偏之見變動不拘權衡
有準則于岐黃一道時過半矣

辨賄販散等方

二分則義
中及云病

者飲自己
之尿取名
濕疫培生
湯佳病者
之尿有熱
毒斷不可
服運便耳

二分所義書中載賠則散一方用大黃爲君而以殭蚕蟬
蛻薑黃佐之共爲夫蜜酒調服用治三十六般熱疫夫一
方而治多病者唯著應膏爲然除此則廣東蟻九亦有此
說然彼必有一單不症用某引和服是丸雖一方而引因
病異則引之所開敢大視無引而一方兼治者不侔矣且
瘟疫更與雜症不同有表裡分傳之異經腑臟胃之殊者
少強弱之分天上風土之別焉能以一方而治三十。六症
乎余始得此書血瘟疫盛行之年曾修和一料備用後偶
出門一女孫串瘟疫家中人因取與服服之返泄渴昏睡

增劇筠谷兄修合此藥云乳蛾等疾病而有一血上不其
故孫女服之增劇者以邪尚在表方內有人不宜乎不受
至于云治咽喉或于熱毒相宜豈三十六肝虫詎無一應
者乎

中又有大小復甦飲于大小清涼滌
疫散清疫飲驅疫飲等方總以黃蘗爲君更雜錄諸寒若
藥以佐之
有至二十味之多者更斷斷不敢用
也

辨張景岳言瘟疫

景岳全書各門中講解俱極精詳透門堆瘟疫

然緣其將傷寒瘟疫二症攪作一團未曾分晰

也其論瘟疫曰瘟疫本卽傷寒無非外邪之病但染時氣而病無少長率相似者是卽瘟疫之謂云云

第傷寒爲寒所傷

或涼雨所逼或風雪所激或失足落水或乍然脫衣或當風而寢以致頭痛憎寒皮膚壯熱脊強無汗方謂之傷寒此係自取之病病只一人而止而衆人不然也至于瘟疫絕無諸項感觸而抖然患症且非一人鄉邑閭里動皆相似其症雖有頭痛身熱不上而多汗始終一干爲熱

與傷寒迥乎不同治法亦異如何曰瘟疫本卽傷寒
乎天旣曰本卽傷寒再立瘟疫一門豈非贅瘤乎且旣曰
本卽傷寒而又曰染時氣而病吾不知先傷于寒而後爲
時氣所染乎抑染于時氣而後爲寒所傷乎抑二者并集
于一人之身乎總緣傷寒瘟疫原未嘗清猶敝帖括者認
題不真下筆便錯雖詞藻絢爛而不中肯綮總屬陳飯土
羹其何以言文哉

最不敢從者發汗峻補二條抑知瘟疫豈

強注之所能解者乎而峻補豈可施於熱毒之人乎唯注下後或顯虛症或虛極久病之人而感瘟者用補法亦目不可少也

辨嘔吐噦呃逆欬逆噫氣

噦謂大聲
音近耳

丹溪書嘔吐門曰有聲有物謂之嘔吐是混嘔吐爲一張景岳亦不以爲然而未嘗深辨及觀李東垣則以嘔爲有聲有物孫真人則以吐爲有物無聲詳嘔吐字意當以孫李爲是字彙嘔亦同謳大謳必有聲而訥菴謂氣逆則嘔蓋氣一逆必作聲隨擁所食之物而俱出矣吐則較嘔所

癆瘵素逆
統宿疾

出更易開口便漾出又豈有聲哉至于噦之一症經中之
病篇直作呃逆而河間海藏以噦爲乾嘔張景岳謂呃
逆古無是名其在內經卽謂之噦是特古今之稱名不同
而噦與呃逆斷不可混爲一症也噦雖以河間海藏說爲
是而東垣十書癆回集中則謂噦之聲濁惡長而有力直
至氣盡而後止非如乾嘔之輕而不甚也是較之劉王所
說則更明白曉暢矣至于呃逆卽東垣所謂吃忒者是此
症稱名不一隨其方言而呼之有曰格得者有曰打呃者
有曰打歌得者總與噦爲一症明係今之所謂打呃是也

靈樞則謂之餽音旬所謂餽不得息者是也觀金鑑中以爲格格連聲氣從臍下來自衝脉出口作聲豈非善于形容者乎至于欬逆與呃逆則又不可相混有以欬逆爲呃逆者有以欬逆爲噦者是皆未詳味經文耳經本以欬嗽氣逆爲言如氣交變大論曰歲金太過甚則喘咳逆氣又曰欬逆甚而血溢益以欬嗽不止而血隨氣上耳未聞打呃而見血者也此欬逆之非呃逆亦甚明矣而欬逆之非噦又何待辨乎至噫氣之說靈樞云寒氣客於胃厥逆從下上散復出於胃故爲噫仲景謂上焦受中焦氣未和不能

消是故能噫據此則噫者卽噉氣也亦卽俗之所謂拔無也此理甚明人所易曉總之有聲有物曰嘔氣方無及以吐有聲無物曰噦呃逆者卽打呃之謂欬逆者欬所謂拔以致氣逆上衝也噫者字彙解作飽食氣滿至有聲豈非所謂拔氣者乎症各不同斷難相混至於得病之也與火治法各有虛實寒熱之異散見諸門茲不贅

辨五疫治法

顏氏云春三月行青筋牽病夏三月行赤脉積病秋風亦生於氣鯉病冬三月行黑骨瘟病四季月各餘十八日土

王用事行黃肉隨病後人又以木火金水土五炁投之治各有定法其中止有所謂五疫乃天地之厲氣人中之則各隨其臟氣以爲病之說尚屬近理如所謂青筋牽等名色矜竒立異無益症治其用方如春三月用羌活湯夏三月用雙解散等法亦見沾滯至秋三月天漸涼冷反用三黃石膏殊不近理至其所用藥俱係發散等劑亦非治瘟疫的方也

辨吳又可疫有九傳治法中先裡後表

吳又可九傳治法有先裡而後表者始則發熱漸加裡症

下之裡症除二三日內又發熱反加頭痛身痛脉浮者宜
曰虎湯按其瘟疫初起治法云脉長洪而數大汗多渴此
白虎湯症又云白虎治瘟疫脉長洪而數又云脉長洪而
數白虎清涼解散服之或戰汗自汗而解是凡三言白虎
症而絕無脉浮之說也至于發熱頭痛雖列于白虎湯之
下而又無身痛前後多所滲漏不符看來頭身痛脉浮三
症似宜小柴胡加羌防始與症對而乃用白虎何也

辨瘟疫止在三陽經

吳又可之瘟疫論世所盛行其中達原飲固爲治瘟疫之

至於第言瘟邪浮越於某經者卽加某經之藥止有三陽三衣治法至於邪之傳裡者僅有入陽明胃腑一條傳三陰則畧而不及夫云邪伏膜原自內達外不似傷寒之按次侍經則可若云邪總不入三陰是將臟腑經絡劃然中此而不及何是衛總杆格而不通矣此豈理也哉卽傷之何呂以見于之說識者猶或非之至於瘟疫之傳變且並府三陰而遺之何也每見患瘟疫者腹脹滿大便實或自利發黃以及四肢諸症非傳入足太陰經乎舌乾口燥咽痛但欲寐非傳入足少陰經乎煩滿囊縮以及善怒或自

軒逆動搖并脇肋諸症非傳入足厥陰經乎且不特此也
患在皮毛氣分而哮喘咳嗽者知邪之入肺患在神志昏
冒而面赤喜笑者知邪之入心是則五臟六腑瘟疫邪之傳
變無所不到謂臟腑諸症不能一時皆現則可謂瘟疫邪止
在三陽經必無是理也。

辨內傷寒認作瘟疫

內傷寒之症初起無熱不渴止有胸膈脹滿悶面唇皆
無光澤或瀉而胸腹急痛手足冷自覺不舒快少情緒其
脈沉細此症總由過食生冷傷於脾胃所致故方書名之

爲內傷寒而以治中湯溫散之此症多感於夏月而瘟疫
盛行之時與瘟疫甫愈之後或感此症昧者誤認爲瘟疫
而以疫法治之鮮有不敗事者其弊必至於卒不能食泄
瀉不止而釀成大患唯用治中湯加減出入寒甚則加熟
附食積則加麥芽神麴肉積則加山楂嘔惡則加藿香製
半夏鮮薑砂仁兼濕則加茯苓蒼朮胸脇痛悶則加枳壳
白芍柴胡若內既傷生冷而外復感風寒則用藿香正氣
散或五積散平胃散等加減治之

治中湯 卽埋中湯加陳皮青皮

霍香正氣散 治外感風寒內傷飲食憎寒壯熱頭痛嘔

胸膈滿悶咳嗽氣喘及傷冷傷濕瘧暑霍亂吐瀉凡感

嵐瘴不正之氣者並增減用之

錦按疫初起用達原飲等不效者用此方加減治之

藿香 蘇葉 白芷 陳皮 半夏製

茯苓 甘草 厚朴姜汁炒 桔梗 白朮泔浸土炒

大腹皮

洗極淨醃烏好集其樹毛落皮上洗不淨殺人

蒼朮

泔浸炒原方無今加入無汗者更宜

又一方加木瓜傷食加消導藥 姜棗煎

五積散 治外感風寒內傷生冷其曰五積者能散寒積

食積氣積血積痰積凡身熱無汗頭身項背疼痛拘急

胸滿惡食嘔吐腹痛寒熱往來並治

蒼朮

酒浸炒

厚朴

姜汁炒

陳皮

甘草

半夏

製

當歸

酒洗

川芎

酒洗

白芍

酒炒

茯苓

枳殼

炒

桔梗

白芷

蘇葉

改代麻黃

乾薑

表重用鮮

肉桂

表重用枝

生葱薑煎

平胃散

治脾濕痰痞宿食滿悶嘔瀉及嵐瘴不服水土

蒼朮

泔浸炒

厚朴

姜炒

陳皮

炙草

姜棗煎

如傷食加神麴麥芽或枳實濕勝加五苓散痰多加製

半夏脾倦不思食加參朮痞悶加枳壳木香香附大腹
結閉加熱軍小便赤澁加苓澤風寒加葱豉蘇芷防風
內傷寒發班

患內傷寒後又兼之寒熱間作鼻中微出血兩手脉沉澹
皮膚按之殊無大熱身上有班三五點此內傷寒班也調
中湯主之夾暑加香薷扁豆

調中湯

陳皮 半夏製 甘草 桔梗 蒼朮

泔浸炒

川芎 酒洗 白芍 酒炒 砂仁 炒研 藿香 羌活

白芷

麻黃或伐蘇葉桂枝

枳殼

生姜煎

內傷寒發黃

內傷寒發黃者其人脾胃素虛或食寒涼生冷之物以致
寒實結搏停滯不散中州變寒而發黃色或嘔吐或腹滿
自利小便短少者宜調中湯見痛加茵陳或理中湯加茵陳
枳實葶果手足逆冷脈沉者加附子

按內傷寒為病本係雜症而採入瘟疫門中者因瘟
疫愈後不戒生冷每患此症或再微發熱惡寒昧者
不察往往誤認為瘟病之復而以疫法治之寒涼清

解害人不淺故特爲拈出再者瘟疫之復不能吃煙內
傷寒始終能吃煙以此爲辨錦誌

辨汗無太早下無太晚

此事難知云汗無太早非預早之早乃早晚之早
謂當日午以前謂陽之分當發其汗午後陰之分
不當發汗下無太晚非待入之晚乃當日之後爲
陰之分也下之謂當已前爲陽之分也

凡人初感寒邪一覺愒寒頭痛身痛身熱脊強便宜用溫
散之劑速發其汗斷無不愈之理雖年老及平素虛怯之
人不易作汗者覺病卽服汗劑其邪亦無不卽當時解散
者此余屢用而屢效者也遲則寒邪稽留傳變百出而班

黃狂躁等症作矣所以一覺感寒便宜速治若必如難知所說或日午以後感寒必遲至明朝午前服汗劑不亦晚乎假如午後感寒此時雖屬陰分亦宜速服散劑且服之多未有當時卽汗者必俟次早藥力旣行又逢陽分出汗更易耳所謂汗無太早者明係預早之早豈早晚之早乎傷寒如此瘟疫亦然瘟疫之所謂不宜發汗者指麻桂紫蘇而言至於元霜素雪等丹豈非京散之劑乎瘟疫初起當卽服藥亦不必拘以時日也至所謂太晚之說分明解作遲下非早辰夜晚第此言爲庸醫不應下而妄下之

者說法耳然其言不能無弊也若遇宜急下之症而必執下無太晚之說則陽明胃府勢必被邪火燒至燥裂而不可救矣下劑若必拘以時不亦謬哉早晚二字當易以遲速云活無太速下無太遲則不煩言而解矣

辨鄭聲

論曰實則譫語虛則鄭聲重

平聲

語也夫聲必有語語必有

聲蓋言聲則鄭而語則重也人虛而精神衰乏不能自主語言重複絮聒而聲則有類於鄭耳鄭聲淫是狀其聲之惇匕唧唧頗似淫聲惟馮氏謂聲戰無力不能接續這字

出於喉中爲得解成氏亦謂鄭衛之聲而王氏駁之則非
矣又有解鄭聲爲鄭重者夫曰鄭重其事則有矣曰鄭重
分明則有矣以此解病人之聲得乎要之指鄭之淫聲取
譬無疑也凡患此者其聲必低氣必短脉必無力色必萎
悴其兼症則目無赤色舌無胎刺身無大熱口無煩渴小
便清長大便滑潤或泄瀉凡自言自語喃喃不全者皆是
也瘟疫始終一於爲熱罕見此症或汗多亡陽下多亡陰
者有之若果虛最忌攻伐少有差謬無不卽死速宜察其
精神辨其陰陽斟酌溫補以救其根本爲要若昏沉上氣

喘促發呃不止不省人事者危

辨褚氏春瘟夏疫

瘟疫之說前諸論中已詳哉其言之矣茲讀褚氏遺書審微篇有云春瘟夏疫內症先出是將瘟疫二字拆開分配春夏
總緣平看瘟疫二字且未來其理解

須知諸凡雜症苟一時所患皆同者皆有疫氣以行乎其間如徭役之役故悉得以役名之而所該之病甚廣瘟疫不過疫中之一症耳乃串講之辭若曰瘟病之爲厲疫如是也若必如褚氏春瘟夏疫之說是將瘟疫二字

折開對待言之矣由此以推則世之稱傷寒者獨不可云
秋爲傷而冬爲寒乎知分作傷病寒病之不通則知言春
瘟夏疫者之未妥也明矣至於褚氏言男女異脉云女子
陰逆自上生下故左寸爲受命之根萬物從土而出故左
關爲脾生左尺肺肺生右寸腎腎生右關肝肝生右尺心
寸心

戴起宗曾非之今不

解害人不淺故特爲拈出再者瘟疫之復不能吃粒
內傷寒始終能吃煙以此爲辨錦誌

松峯說疫卷之五

諸城劉奎松峯著輯 男秉錦澤西述較

福山劉嗣宗南癸參閱 表姪李逢虔謹菴錄

諸方

避瘟方

雄黃丸 治瘟不相染

明雄一兩研 丹參 赤小豆炒熟 鬼箭羽各二兩

共爲末蜜丸梧子大每日空心溫水下五丸

避瘟丹 燒之能避一切穢惡邪氣

蒼朮

乳香

甘松

細辛

芸香

降真香等分

糊爲丸豆大每用一九焚之良久又焚一九畧有香氣
卽妙

福建香茶餅 能辟一切瘴氣瘟疫傷寒穢氣不時噉化

沉香

白檀各一兩

兒茶二兩

粉草

五錢

麝香

五分

冰片三分

共爲細末糯米湯調丸黍米大噉化

透頂清涼散

凡遇時令不正瘟疫流行人各帶之或嗅

鼻可免侵染

白芷

細辛

當歸

明雄

牙皂

等分

共爲細末磁瓶貯勿洩氣用時令病者噙水口內將藥
啗鼻吐水取嚏不嚏再吹嚏方止已患未患者皆宜用
神聖辟瘟丹

蒼朮

君倍

香附

羌活

獨活

甘松

三奈

白芷

赤箭

大黃

雄黃

各等分

共爲末糊丸彈子大黃丹爲衣晒乾正月初一平旦焚
一炷辟除一歲瘟疫邪氣

老君神明散 避瘟疫

蒼朮

一錢

桔梗

二錢五分

細辛

附子

炮去黑皮各二兩

烏頭

四兩去皮尖

共爲細末帶於身邊可免瘟疫 不可服

藜蘆散一名有散辟瘟疫

藜蘆

躑躅

乾姜

各一兩

丹皮

皂角

各一兩六錢

細辛

十八銖

桂枝

一作桂心

附子

硃砂

一作真硃另研各六兩

共爲粗末絳囊係臂上男左女右覺病作取藥末少許

納鼻中 嫌分兩多和時四分之一亦可後皆倣此

務成子螢火丸

主辟瘟疾惡氣百鬼虎狼蛇虺蜂蠆諸

毒五兵白及盜賊凶害皆避之

螢火虫

鬼箭羽去反

煖藥

礬石

各一兩煖枯

雄黃

雌黃各二兩

廬羊角

銀鼈灰

錘柄

入斧頭木燒焦各兩半

共為粗末以鷄子青確雞冠一具和之如杏仁大紅紬

縫三角囊盛五丸帶左臂上仍可掛於門戶

屑蘇酒

大黃

十五銖

白朮

十銖

桔梗

十五銖

川椒

十五銖炒出汗

防風

六銖

烏頭

六銖炒

桂枝

十五銖

蓼莢

六銖乃今之二錢半廿四銖為一兩

入紅囊中干臘月晦日懸井中毋著水元旦出藥入酒

從疑之訛
音恰疑即
從疑之訛
學者辨之

中煎數沸於東向戶中飲之先自小者飲起飲三朝若
每年飲可代代無病內外井中宜悉著藥忌猪羊牛肉
生葱桃李雀肉

辟瘟丹

蒼朮 紅棗 和丸燒之

又方

時瘟疫流行水缸內每早投黑豆一握全家無恙

五更潛投黑豆大握于井中勿令人見飲水家俱無恙

入病家不染方

香油和雄黃蒼朮末塗鼻孔既出紙條探嚏如無黃朮
卽香油亦可飲雄黃酒一杯或止抹雄黃于鼻孔卽妙
瘟病不染

五月五日午時多採蒼耳嫩葉陰乾收之遇疫時爲末
冷水服二錢或水煎舉家皆飲能辟邪惡

避瘟良方 瘟疫盛行車前子隔紙焙爲末服卽不染

瘟疫不染方 將初病人貼身衣服甕上蒸過合家不染

又避瘟方 入瘟家以麻油塗鼻孔出再取嚏則不染

避瘟方 以桃葉上重搗爛凉水調服瘟疫不染

方止用桃
中露尿

涼疑作尿

又方 以赤小豆糯米浸水缸中每日取水用

又方 以貫仲浸水用之或蒼朮浸水用

斷瘟法 密以艾炙病人床四角各一肚勿令人知不染

凡入瘟疫家常以雞鳴時默念四海神名三七遍百邪不犯

東海神阿明 西海神巨乘 南海神祝融

北海神禺强 每入病室存心念三遍勿出口

雄狐屎 在山中石上或竹木上尖頭者 燒之辟惡去瘟疫

茵陳烏梅湯 治瘟疫

九九晝日茵陳連根採陰乾遇瘟起每二人用茵陳五

分烏梅二个打碎水二盅煎八分熱服汗出卽愈

赤豆避瘟法

正月七日

用新布囊盛赤小豆置井中三日取出舉家皆服男十粒女廿粒瘟則遠避

薑酒避瘟法

凡遇瘟疫行時出門須先飲燒酒一盃回家時仍再飲一杯然後食別物但勿至醉不能飲者出入可食姜蒜或以塞鼻

神砂辟瘟丸

神砂一兩 研細白蜜和丸麻子大以太歲日或平旦一

家皆向東方用井花令木各吞甘一丸永無疫患忌薑

一日

一方 元日五更以紅棗祭五瘟畢合家食之吉

一方 正月上寅日取女菁草末三合絳袋盛掛帳中能

避瘟

避瘟殺鬼丸 如要少做或四分之一或改兩作錢皆可
方有空心青蟹甲作龜甲

雄黃 雌黃各三兩 山甲 龍骨 蟹甲

蝟皮各二兩 川芎二兩 禹餘糧二兩 真珠內加 羚羊角七兩

虎頭骨

十枚雞兩

十五枚如無以芫青十五枚代

東門上雄雞頭一枚

共為末蠟溶為丸彈子大每正旦病家門口燒一兩丸

並每人帶一丸

男左女右

避疫殺鬼並弔喪問疾皆吉

太蒼公避瘟丹

凡官舍旅館久無人到積濕積邪容易

侵人焚之可以遠此五六月終日焚之可以避瘟

蒼木

一斤

台芎

黃連

白朮

羌活

各八兩

川芎

草烏

細辛

柴胡

防風

獨活

甘草

藥本

白芷

香附

當歸

荆芥

天麻

官桂

甘松

于姜

三奈

麻黃

牙皂

白芍各四兩

麝香 三分

共爲細末

點之

一方 除夜將家中所餘雜藥

調和成一處者

焚之並焚糞可避瘟疫

一方 除夜有行瘟使者降於人間以黃紙朱書天行已

過四字貼於門額吉

一方 懸掛馬尾松枝可免瘟疫

一方 天行時氣宅舍怪異并燒降真香有驗

一方 梵木香燒之去惡氣除生羌產梵渠國

一方 燒青木香薰陸安息膠香可避瘟疫

燒香避瘟 樞密王博文每於正旦四更燒丁香避瘟

人病家不染 用舌頂土腭努力閉氣一口使氣充滿毛竅則不染

辟瘟丹 燒之避瘟邪氣

乳香 蒼朮 細辛 生草 川芎

降真 白檀 棗肉丸焚燒

不染瘟方

雄黃 五錢 赤小豆 一兩 蒼朮 一兩 附浸去皮壁土炒

共爲細末水調每服一錢

又方 姜豉和白朮浸酒舉家常服 一方無朮

又方 初伏採黃花蒿陰乾冬至日研末收存至元旦密調服

又方 六月六日採馬齒莧晒乾元旦煮熟鹽醋調食之

又方 元日用麻子三七粒赤豆七粒共撒井中避瘟

又方 元日吞赤小豆七粒服椒酒一杯却病避瘟

又方 立春後庚子日溫蔓菁汁合家并服不拘多少可

避瘟羅蔔汁亦可 蔓菁亦云蕪菁

麻豆投井方 除夜四更時取麻子赤小豆各廿七粒並
佳人髮少許同投井中終歲無傷寒瘟疫

髮沉投井 除夜以合家頭髮燒灰同腳底泥包投井中
呪曰我家眷屬不害傷寒瘟疫遠邇四季平安急急如
九天金輪王勒令

避瘟方

於病人出汗時身下舒一挑担則不傳染須舒於褥底
下不得近身恐挑担涼水汗不出

殺鬼丹

虎頭骨

真者酥炙

桃梟

係桃之乾在樹上者

斧頭木

係斧柄入斧頭中之木

雄黃

明亮者

桃仁

去皮尖麤炒黃

朱砂

光明者另研各一錢五分

犀角屑

木香

月所

白朮

鬼箭羽

各一錢

麝香

七分五厘

共爲粗末帶之可避瘟疫

一方 於春分日用遠志去心水煎日未出時東面飲二

盞探吐則疾疫不生

一方 於穀雨以後用川芎蒼朮白芷藁本零陵香各等分煎水沐浴三次以泄其汗汗出臭者無病

吐免疫

桃湯 元日服桃湯壓邪氣制百鬼

納椒井中 臘日之夜令人持椒卧井旁無與人言納椒井中可除瘟病一方除夜取椒甘粒行之

又方 元日飲蒼米湯並用湯沐浴及焚燒可避終歲疫逐蠅祛疫法

憶昔年入夏瘟疫大行有紅頭青蠅千日爲羣凡入人家必有患瘟疫而亡者後傳一法用鐵盆不拘大小納日凡四兩用滾水傾入盆內令滿將凡化開次以口含

火酒連噴三口於盆內又取桃核一桃割兩頭令通去
仁用紙包鎗茶少許塞桃核空殼內用紅線繩一根穿
入核內將紅線爲絃取桃枝縛作一弓安於鉢盆中凡
水內弓背在下已絃向上再用挑木作箭三枝插於盆
外青蠅自當速避舉家卽免痘病其盆隨便安於宅之
僻處經年莫動相傳極效松峯記

避瘟方 新布盛大豆納井中一宿取出每服七粒

避疫椒栢酒 除日用椒三七粒東向側栢七枝浸酒一
甌元日飲之

通治疫癘方 常以東行桃枝煎湯浴之未病已病皆治

避瘟方 以絳囊盛馬蹄屑佩之男左女右

預防熱病熱治急黃賊風葛粉二升生地一升豉半升食後米飲服三錢

日三服已病則日五服

避瘟不染 稞米為末頓服之

夏方 三月三口取黍麴和菜作羹食

預解瘡疹 茜根煎汁入少酒服時行疹子正發時服此則可無患

李子建殺鬼元辟瘟疫殺一切藜蘆三兩虎頭骨兩半雄黃兒白

天雄皂莢無莢各五錢共為末揉入艾絨中用壯紙二層

持住箇週痘疫時點著薰病人房中

七物虎頭元

辟瘟殺鬼

虎頭硃砂雄黃

各兩半

鬼口皂莢焦莢雄

黃

各一兩

爲末鎔蠟丸彈子大紅絹袋盛一九繫男左女

右臂上又懸屋四角晦望夜半各當戶燒一九晨起各

人吞小豆大一丸則不傳染

太乙流金散

大辟瘟疫

雄黃

兩半

羚羊角

兩一雌黃白礬鬼箭

共粗末三角絳囊盛一兩帶胸前并掛戶上又青布包少

許中庭燒之

臘月鼠

燒之辟瘟氣又于正旦所居房理之辟瘟疫氣

除瘟方

松峯審定五瘟丹

一名凉水金丹 一名代天宣化母

專治時症瘟疫發熱

頭身腹痛譫語無汗日久不愈或發黃斑疹與痧或二

便五六日不行等症並暑月一切熱症又解瘰癧瘡毒

甘草

製甲巳年為君

黃芩

乙庚年為君

黃柏

丙辛年為君

梔子

丁壬年為君

黃連

戊癸年為君

香附

去淨細毛

蘇葉

鳳頭者

蒼米

米泔浸

陳皮

以上四味為臣

明雄

另研細

硃砂

另研細

製甘草法

立冬日取

大青竹杆一頭裁去節一頭留節納生甘草末于內蠟封緊日浸糞坑中頭冬至取出晒乾聽用

前甘草等五味當以某年為君者多臣數之半如甘草

等用二兩則香附等四味止用一兩也雄硃又減臣數
之半止用五錢矣於冬至日將甘草等九味共爲末雄
硃另研以一半入甘草等藥末中爲九留一半爲衣再
用飛金爲衣大人服者九如梧子小兒服者九如黍米
雪水生蜜爲丸面東服五十九病輕日淺者一服而愈
病深日久者三四服而痊忌腥辛辣油膩煎炒一切厚
味其分兩如君用一兩臣則五錢多寡不論總臣減君
一半雄硃又減臣一半也

松峯曰此方見萬氏家傳瘟疫門中與馬氏瘟疫發

源書內所載互有異同萬氏有蒼陳而馬則無之萬氏香附製炒而馬氏言俱不見火萬氏用雪爲丸而馬氏用大黃膏子萬氏不帖金而馬氏則帖金萬氏服用滾白水而馬氏則用凉水萬氏甘草法製而馬氏不法製其餘俱各相同愚意甘草製之則成人中黃大能祛疫蒼米香附吾用其生者蓋炒之則未免有火氣飛金重帖亦妙以其鎮靜也至於用大黃膏爲丸於初感瘟疫邪尚在經者大不相宜當仍以雪水爲丸如恐不粘酌加生蜜則易之初感瘟疫者用

滾白水送。大熱時冷水送。不大便時方用大黃水送。
取二方而斟酌盡善。此爲近之。

柴胡白虎煎 治陽明溫熱表邪不解等症

柴胡

黃芩

麥冬

各二錢

石膏

三錢

甘草

七分

引用竹葉

柴葛煎

治溫毒表裡俱熱能散毒養陰並治痘疹

柴胡

乾葛

黃芩

連翹

去隔

白芍

酒炒

甘草

水煎服

歸柴飲

治營虛不能作汗及真陰不足外感寒上難解

者此神方也 大便多澹者以冬木代當歸亦佳

當歸 一兩 柴胡 五錢 炙草 八分

流水煎或加薑三五片或加陳皮 一錢或加參

人馬平安散 治一切時症風寒暑濕內傷生冷飲食頭
風頭痛心痛絞腸沙閉氣小腸疝氣牙痛猪羊瘋症用
替脚點兩眼角或吹鼻孔男左女右

煇硝 二錢 硃砂

明雄 各一錢

冰片 五分

麝香 一錢

共爲細末端陽午時修合磁瓶收貯勿出氣

神仙祛瘟方 服後已病者卽痊未病者不染

撫芎

八錢五分

蒼米

三錢三分三厘米泔浸炒

甘草

一錢六分六厘

乾葛

一錢三分六厘

生薑三片葱三科連根水二碗煎八分空心服病急者

卽當急服勿拘空心之說 撫芎用一錢亦效已試

葛根淡豉湯 治四時感冒

葛根

五錢

淡豉

三錢

煎服入姜汁少許

人沖黃丸

一味不拘多少飯爲丸續豆大下十五丸

炒麤慰法

熱邪傳裡服藥後將塩炒麤一升絹包於病人腹上熨之藥氣得熱則行大便秘通

松毛酒 可避五年瘟

松毛 細切末

酒下二錢日三服

姜糖引 治瘟疫兼治傷寒

白糖一兩

生薑 五錢

傷寒

滾水和服不應再服

頭痛如破

連鬚葱 半斤 生薑 二兩

水煮溫服

姜熨法 治胸膈不寬一切寒結熱結水結痰結痞氣結

生薑搗如泥將汁滓出存用取渣炒熱絹包揉熨心胸

切下渣冷入汁炒再熨

仙傳吐法 治一切瘟疫傷寒傷風傷酒傷食病初得用之更宜

一百沸湯半碗以手揉肚再飲再揉直至腹無所容用

雞翎探吐吐後煎葱醋湯飲之覆衣取汗甚捷

諸葛行軍散

菜豆粉一兩 麻黃末八錢

共研爛和勻每服一錢用無根水調服汗出即愈

靈癍避瘟丹

蒼本一斤 降香四兩 雄黃二兩 硫黃一兩 硝石一兩

栢葉半斤 丹參二兩 桂皮二兩 藿香二兩 白芷四兩

桃頭

四月五月五日午時收

雄狐糞

二兩尖頭者是

菖蒲根

四兩

升麻

一兩

商陸根

二兩

大黃

二兩

羌活

二兩

獨活

二兩

雌黃

一兩

噯叭香

如無丁咸

赤小豆

二兩

仙茅

二兩

硃砂

二兩

兒箭羽

二兩

以上共二十四味按二十四炁爲末米糊爲丸如彈子

大焚一丸

松葉按桃頭不知何物豈桃樹尖耶噯叭香出噯叭

國色黑有紅潤者佳以軟靜色明者爲上瘡之能達

邪魅

逐瘟方

地黃

八兩

巨勝子

一升研再同地黃搗爛

牛膝

四兩

五加皮

四兩

地骨皮

四兩

官桂

防風

各二兩

仙靈皮

三兩

用牛乳五兩同甘草湯浸三日以半升同乳拌仙靈皮

放磁瓶內飯鍋中蒸之待牛乳盡出

出字存疑

方以溫水渴

切同前藥剉細袋裝浸于二斗酒中數日藥味全下後

去渣十月朔飲至冬至

一方

雪水能解瘟疫

當收貯所用

單飲煎藥俱可

一方

臘月取皂角燒爲末收貯遇時疫早起井華水調

服一錢或加姜汁蜜少許

井華水清晨第一次及者

乾艾煎 治瘟疫頭痛壯 脉盛

乾艾葉 三升 水一斗煮一升頓服取汗

松峯按水酒以升斗計不行於今久矣况艾葉乎用
時艾葉計以錢水計以盞可耳

椿皮煎 治瘟疫頭痛壯熱初得二三日者

生椿皮 一升 水二升半煎每服八合

松峯云椿係香椿今之臭椿乃悞耳

高柳汁 治瘟疫傷寒不論日之多少

黃蒿心 七个 柳條心 七个

入碗內搗爛或少加濾去渣用雞子一個飛金三貼和

汁攪勻令病人一口吸盡隨即炒鹽半碗研細羅下用

手蘸鹽將病人胸腹并前後心遍擦再速用黃蒿柳條

熬滾水將病人周身盪之照方如是者三次立時發汗

而痊

呂祖塞鼻丹

歌曰沉香木香皆末共乳香礞砂皂角共良薑細辛當歸

各等分巴豆川椒及麝香又加硃砂雄黃等血竭硃砂

熟藥按上每粒丸成桐子大呼吸補瀉便離床口含冷

水面朝上仰不問輕重一炷香祖師留下靈丹藥諸病

間之自安康用此藥治瘟疫亦可故選入治瘟疫應去巴豆

人馬平安行軍散

明雄 硃砂 火硝 枯 乳香去油

見茶 冰片 麝香 硼砂 沒藥去油

各等分共為細末點大眼魚尾左右水麝少加亦可

一點絞腸沙 二點氣腰痛 三點重傷風

四點虫蝎傷 五點火眼發 六點走風痛

七點急心痛 八點急頭痛 九點火牙痛

十點牛馬驢

神柏散 治瘟疫

用廟社中西南柏樹東南枝

疑用嫩枝帶葉者

曬乾研末新汲

水下二錢日三次

六合定中丸

蘇葉

二兩炒

宣木瓜

二兩微炒

真藿香

二兩帶梗

子丁香

一兩研研見火

白檀

一兩雨

香薷

一兩雨不見火

木香

一兩雨不見火

甘草

一兩微炒

共為細末滴水為丸如椒大每服二錢

一治胸膈飽悶用生姜二片煎水服

一嘔吐用滾水半盞對姜汁少許服

一霍亂用生姜二片煎水加炒鹽五分服

一不服水土煨姜三片煎水服

一絞腸沙炒鹽水煎服

一泄瀉生姜煎水服

藕蜜漿 治時氣瘟疫

生藕搗取汁一盞入蜜一合和勻分作兩服

生姜益元煎

益元散

三錢

生姜

三錢

黃酒

水各半盞煎三

滾溫服即愈除瘟解毒

松峯云方書煎藥每言一滾者蓋言煎滾取下落滾
再煎再落如是者三

天行病心悶 用水中苦梔汁服

治瘟方

用紅糖入罐內封固蠟塞口臘月浸糞坑中二月取出

患疫忌葷一日

牛桑飲 治餘熱不退煩渴四肢無力下能飲食

牛旁根生搗汁約五六合空腹分二服服訖取桑葉一大

把炙黃水一升煮五六合服煖覆取汗無葉用枝

白藥散 治瘟疫

白藥子出江西葉似烏旧子如蠶末空腹水頓服卽仰卧一食時候

心頭悶亂或惡心腹內如車鳴刺痛良久或吐利數次

皆勿怪服冷粥一碗止之

神效煎 此方治瘟疫初起自直隸傳來試之亦不甚效意或瘟疫田食積而發者服之始效耶

神麴五錢 青皮一錢 葛根一錢 枳實五錢 紅麴五錢 芫荽根係鮮者更妙

括萎湯

大括萎一个取蘗剉置碗中執湯一碗沃之蓋良久去

渣不拘時服治熱病頭疼發熱

一方 船底苔療天行時疫伏熱溫毒

治瘟疫秘方

麥冬三錢 燈心三十寸 芫荽梗三十寸 棗三枚 竹葉三十片

流水煎執服

治瘟疫並大頭方

大力子

防風

各等分

共爲末每用五錢黃酒一盅水一

大盅同煎至腹溫服蓋被出汗

六一泥飲

治瘟疫八九日已經汗下不退口渴咽乾欲

飲水者

六一泥

即蚯蚓糞

不拘多少新汲水調服

鷄子拖法

治同上

用鷄子打一孔留黃將青傾在病者腹上用手在腹上

圓轉攤搓久則漸成白沫用手抹棄再敲開一雞子依

樣搓之止用四五枚腹內便覺清涼

觀音救苦散

專治傷風傷寒並疫氣所侵稍覺頭昏腦

悶項背拘急吹鼻取嚏毒氣隨散永不染着仙方也

川芎

藿香

黎蘆

各三錢

丹皮

去心

元胡索

硃砂

各二錢

雄黃

白芷

牙皂

各四錢

七味草藥共爲細末硃雄另研調入收貯用時先噙水在口內次以藥吸人兩鼻孔吐水取嚏未病者吹之不染牛馬等受瘟者吹之亦效

治鬼魅魘人法

降香

末一錢

皂角

末一錢

硃砂

雄黃

各三分

麝香

三分與同研

艾葉

五錢揉爛

將藥末揉入艾中草紙裹爲長筒點放床

底則不魔兼祛百怪惡邪之氣

太乙紫金錠

一名紫金丹
一名玉樞丹

瘟疫煩亂發狂喉閉喉風以及陰陽二毒傷寒心悶狂
言胸膈滯塞邪毒未出俱薄荷湯下凡遇天行時疫沿
街闔戶傳染者用桃根湯磨濃滴鼻孔再服少許任入
病家不染兼治數十種雜症用引各殊俱載醫宗金
鑑外科脾發症門中茲不錄

雄黃

三錢取明紅大塊研

朱砂

三錢大而有神氣者研

麝香

三錢真者棟淨皮毛研

川五倍子

二兩一名文蛤色破去更尿研

紅芽大戟

一兩五錢去蘆根洗淨焙乾爲末杭

州紫色者爲上江南土大戟次之

北方綿大戟色白性烈害人勿用

續隨

子 上藥各擇精品於淨室中製畢候端午七夕重

陽或天月德天醫黃道上吉之辰合藥前三日齋戒至

期更衣洗手薰香設藥王牌位焚香拜禱畢將前藥逐

味稱準八大乳鉢內再研數百轉入細石臼內漸加糯

米濃汁調和軟硬得中用杵搗千餘下至極光潤爲度

每錠一錢修和時除使令之人餘皆忌見倣此藥唯在

潔誠方效病人每服一錠勢重者再服一錠以通利爲

度利後溫粥補之

通治瘟病

初得頭痛脉大壯熱

小蒜汁少加水頓服再服即痊

嵐瘴

大蒜

生熟各七片

共食少頃腹鳴或吐血泄瀉即愈

治時氣

猪脂如彈丸溫水化服日三次

苦參酒

治瘟疫欲死并治熱毒氣欲死

苦參

一黃酒一壺煮半壺飲盡當

吐則愈諸毒病服之覆取汗皆愈

比方三見各有不同故并錄之

梓皮飲

生梓白皮

切水煎服

治時氣瘟病頭痛壯熱初得

一二口者

瘟病復感寒邪變為胃皖治同

蕤荷汁

治傷寒瘟病初得頭痛壯熱脉盛者

蕤荷

連根葉搗絞汁服

治瘟疫 虎耳草搗酒服治瘟疫

時行風熱

恭萊

音甜一名菰蓬齊魯多為菰當

搗汁飲之

梨甘飮

通治瘟疫

梨樹皮

大粉草

各一兩

黃秫谷

合

為末

百草霜

錢一共為細末每服三錢白湯日二服

時氣頭痛煩熱

皂角燒研入姜汁蜜各少許水和二錢

服之先以熱水沐浴後服藥取汗即愈

時疾煩悶瀉痢大渴孕婦心熱等症

蘆根

一兩

煎濃湯服

天行熱疾煩渴發狂吸服金石心熱發渴

并煮葶汁服

瘟毒大熱

壯猪乾糞水漬取清飲